

RADIOSYNOWEKTOMIA

Podanie siarczku ^{186}Re / ^{90}Y koloid wskazane jest w leczeniu w następujących zespołach klinicznych:

- reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
- spondyloartropia (reaktywna i/lub łuszczycowa) (ŁZS)
- choroby zapalne stawów o innym podłożu, np. choroba Lome'a
- nawracający wysięk stawowy
- zapalenie stawów na podłożu hemofilii
- zapalenie stawów typu artropatii pirofosforanowej
- barwnikowe brodawczakowo-guzowe zapalenie błony maziowej
- przetrwałe zapalenie wysiękowe po alloplastyce stawu lub innych zabiegach chirurgicznych w obrębie stawu
- zapalenie stawów niezróżnicowane (zapalenie stawów z zapaleniem błony maziowej oraz wysiękiem)
- zapalenie stawu z odkładaniem się soli wapnia

Zalecenia:

- leczony staw powinien być **unieruchomiony przynajmniej przez 48 godzin** (zalecane 72 godziny)
- w przypadku dolegliwości bólowych okładać staw lodem i ewentualnie zażyć leki p/bólowe, np. Paracetamol lub inny
- przez 2 dni po podaniu radioizotopu pić duże ilości płynów (np. woda mineralna) i często korzystać z toalety
- po każdej wizycie w toalecie należy dwukrotnie splukać muszlę i dokładnie umyć ręce
- w przypadku zanieczyszczenia odzieży w ciągu tygodnia od radiosynowektomii należy prać ją osobno
- ciąża jest przeciwwskazana przez okres minimum 4 miesięcy po terapii